



Slika 7. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dojke žena za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Najčešće sijelo raka kod žena je dojka. U zemljama Europske unije, Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije stopa je smrtnosti slična, uz manje ili veće oscilacije na godišnjoj razini, ali sa stalnim trendom opadanja. U 2010. je registriran znatni pad, za koji može postojati više uzroka (djelomično prvi pokazatelji provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, ali i nedovoljno kvalitetno upisivanje vodećeg uzroka smrti, koji može biti "prekriven" nekim drugim stanjem).

Slika 8. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina vrata maternice za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Vrat maternice ne spada u pet vodećih sijela zloćudnih novotvorina u žena, ali je novotvorina koja je dijagnostički lako dostupna i terapijski sasvim izlječiva, ukoliko se nađe u preinvazivnom stadiju. Danas se smatra da niti jedna žena ne bi trebala umrijeti od raka vrata maternice. Razine stope smrtnosti žena Primorsko-goranske županije i Europske unije međusobno su slične, sa silaznim trendom, a u Hrvatskoj je on blago uzlazan. Najnižu stopu bilježi Primorsko-goranska županija.