



**Slika 7.** Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dojke žena za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Najčešće sijelo novotvorina kod žena je dojka. U zemljama Europske unije, Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije stopa je smrtnosti slična, uz manje ili veće oscilacije na godišnjoj razini, ali sa stalnim trendom opadanja. U 2012. godini, nakon pada u 2010., nastavljen je porast stope, no trend je i dalje silazan. Uzrok tome je djelomično i činjenica da se intenzivno radilo na kvaliteti rada mrtvozornika, kako bi novotvorine dojke upisali kao uzrok smrti, a ne neko drugo stanje koje je primarni uzrok smrti "prikirilo".

**Slika 8.** Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina vrata maternice za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Vrat maternice ne spada u pet vodećih sijela zloćudnih novotvorina u žena, ali je novotvorina koja je dijagnostički lako dostupna i terapijski sasvim izlječiva, ukoliko se nađe u preinvazivnom stadiju. Danas se smatra da niti jedna žena ne bi trebala umrijeti od raka vrata maternice. Razine stope smrtnosti žena Primorsko-goranske županije osciliraju, s lagano uzlaznim trendom, no niže su od Europe i Hrvatske.