



Slika 5. Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika



Novotvorine su drugi vodeći uzrok smrti, odgovoran za približno četvrtinu svih umrlih u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji. U zemljama Europske unije, od početka promatranja, razina smrtnosti od novotvorina u stalnom je opadanju i znatno je niža od republičke i županijske stope. Stopa u Primorsko-goranskoj županiji najveću vrijednost doseže u predzadnjoj promatranoj, 2018. godini (240,6/100 000)

Slika 6. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika



Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dušnika, dušnica i pluća znatno je niža u zemljama Europske unije (prosjeak) u odnosu na Hrvatsku i Županiju. Zloćudne novotvorine dušnika, dušnica i pluća izravno su povezane s pušenjem kao vodećim rizikom za ovo sijelo raka. Stopa smrtnosti od raka dušnika, dušnica i pluća u Primorsko-goranskoj županiji ima blago silazni trend te se u cijelom promatranom razdoblju isprepliće s republičkom stopom, koja ne pokazuje veće oscilacije.