



Slika 7. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dojke žena za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Najčešće sijelo novotvorina kod žena je dojka. Više od 90% bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljavanje u tom slučaju iznosi 97%. U zemljama Europske unije i Hrvatskoj u promatranom razdoblju vidljiv je silazni trend. U Primorsko-goranskoj županiji prisutne su oscilacije su zbog manjeg broja stanovnika i manjeg apsolutnog broja umrlih (2019. godine 19 žena, 2018. godine 32 žene starosti 0-64 umrle su od karcinoma dojke). Najvišu razinu stopa je dosegla 2018. godine a najnižu 2013. godine. Županijska stopa smrtnosti cijelo promatrano razdoblje isprepliće se s Europskom i republičkom.

Slika 8. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina vrata maternice za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Vrat maternice ne spada u pet vodećih sijela zloćudnih novotvorina u žena, ali je novotvorina koja je značajna jer je dijagnostički lako dostupna i potpuno izlječiva, ako se dijagnosticira u preinvazivnom stadiju. Danas se smatra da niti jedna žena ne bi trebala umrijeti od raka vrata maternice. Razine stope smrtnosti žena Primorsko-goranske županije u promatranom razdoblju osciliraju, zbog malog apsolutnog broja umrlih (2019. dvije žene, 2018. šest žena starosti 0-64 umrle od karcinoma vrata maternice) i zbog manjeg broja stanovnika. Županijska stopa je do 2017. godine bila niža od Europske i državne, 2018. godine vidljiv je skok, da bi 2019. godine stopa opet pala.