



Slika 7. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dojke žena za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Jedno od najčešćih sijela novotvorina kod žena je dojka. Više od 90% bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljavanje u tom slučaju iznosi 97%. U zemljama Europske unije i Hrvatskoj u promatranom razdoblju vidljiv je blago silazni trend. U Primorsko-goranskoj županiji prisutne su oscilacije zbog manjeg broja stanovnika i manjeg apsolutnog broja umrlih (od karcinoma dojke 2022. godine umrlo je 13 žena starosti 0-64, 2021. godine umrle su 23 žene, te 2020. godine 22 žene). Najvišu razinu stopa je dosegla 2018. godine (16,2/100 000), a najnižu 2013. godine (6,6/100 000). Županijska stopa smrtnosti cijelo promatrano razdoblje isprepliće se s Europskom i republičkom.

Slika 8. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina od debelog crijeva do analnog kanala na 100 000 stanovnika



Rak debelog i završnog crijeva nalazi se među tri najčešća sijela raka u Primorsko-goranskoj županiji. Najveću standardiziranu stopu smrtnosti među žiteljima županije bilježimo 2018. godine (40,2/100 000), a najnižu 2015. (31,6/100000 stanovnika).

Standardizirana stopa smrtnosti od kolorektalnog karcinoma niža je u zemljama Europske unije u odnosu na Hrvatsku i Županiju. Trend smrtnosti od zloćudnih novotvorina debelog crijeva u promatranom razdoblju blago je silazan, pri čemu kod stanovnika Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije pada sličnom stopom i progresijom.

Potrebno je povećati svjesnost populacije o važnosti redovitih preventivnih pregleda kao i dostupnih metoda ranog otkrivanja raka te povećati razinu zdravstvene prosvijećenosti.