



Slika 5. Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika



Novotvorine su drugi vodeći uzrok smrti, odgovoran za približno četvrtinu svih umrlih u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji. U zemljama Europske unije, od početka promatranja, razina smrtnosti od novotvorina u stalnom je opadanju, a stopa smrtnosti znatno je niža od republičke i županijske stope. Državna stopa smrtnosti ima blago silazni trend, kao i županijska koja najnižu vrijednost doseže u 2023. godini (187/100 000). Za daljnje smanjenje stope smrtnosti od novotvorina, nužno je povećati svjesnost populacije o važnosti redovitih preventivnih pregleda kao i o dostupnim metodama ranog otkrivanja raka.

Slika 6. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika



Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dušnika, dušnica i pluća znatno je niža u zemljama Europske unije (prosjeak) u odnosu na Hrvatsku i Županiju. Zloćudne novotvorine dušnika, dušnica i pluća izravno su povezane s pušenjem kao vodećim rizikom za ovo sijelo raka. Stopa smrtnosti od raka dušnika, dušnica i pluća u Primorsko-goranskoj županiji u cijelom promatranom razdoblju isprepliće se s republičkom stopom, koja ne pokazuje veće oscilacije, te u 2023. pokazuje minimalan uzlazni trend.